

Bromus (Smith, 1980; Pignatti, 1982; Pavlick & Anderton in Barkworth et al. (2007); contributi vari di diversi autori, principalm. H. Scholz 2008, 2009, 2011) – 28 luglio 2013

Bromus alopecuros Poir.

Bromus anatolicus Boiss. & Heldr.

Bromus arvensis L. subsp. *arvensis*

Bromus arvensis L. subsp. *segetalis* H. Scholz

Bromus brachystachys Hornung

Bromus caroli-henrici Greuter

Bromus commutatus Schrad. subsp. *commutatus*

Bromus commutatus Schrad. subsp. *decipiens* (Bomble & H. Scholz) H. Scholz

Bromus grossus Desf. ex DC.

Bromus hordeaceus L.

Bromus intermedius Guss. (= subsp. *divaricatus* Bonnier & Layens)

Bromus japonicus Houtt.

Bromus japonicus Houtt.

Bromus lanceolatus Roth

Bromus lepidus Holmb.

Bromus molliformis J. Lloyd (= *B. hordeaceus* subsp. *divaricatus* sensu Kerguélen)

Bromus neglectus (Parl.) Nyman

Bromus parvispiculatus H. Scholz

Bromus pseudothominei P.M. Sm. pro hybr.

Bromus racemosus L.

Bromus scoparius L.

Bromus secalinus L.

Bromus squarrosum L.

Bromus subsquarrosum Borbás

Bromus thominei Hardouin

CHIAVE

1 Margini del lemma arrotolati; basi dei fiori e segmenti della rachilla visibili a maturità; antecio fortemente convoluto, perlopiù ispessito a bastoncino

2 Antere 2.5-5 mm; spighette spesso arrossate *B. arvensis*

- Lemma 7-8(9) mm, a maturità in asse con la spighetta subsp. *arvensis*

- Lemma fino a 6 mm, a maturità divergente dall'asse della spighetta subsp. *segetalis*

2 Antere 0.7-3 mm; spighette mai arrossate

3 Guaine inferiori glabre o con pubescenza sparsa, prive di setole; lemma 6.5-8.5(-10) mm, con margini arrotondati

4 Spighette (10)13-25(34) mm; lemma 6.5-9.5(10) mm; resta 0-10 mm

5 Lemma con margini fortemente ripiegati sull'antecio e strettamente aderente a quest'ultimo; antecio subcilindrico; cariosside a ilo profondo; rachilla ben visibile, persistente; guaine ± glabre

..... *B. secalinus*

5 Lemma con margini poco ripiegati sull'antecio e scarsamente aderente o libero da quest'ultimo; antecio appiattito o subconcavo; cariosside con ilo superficiale; rachilla poco visibile, fragile; guaine pelose

..... *B. commutatus* subsp. *decipiens*

4 Spighette (15)20-34(46) mm; lemma (8)10-14(16) mm; resta (0)10.5-14 mm *B. grossus*

3 Guaine inferiori uniformemente setolose; lemma 8-11.5 mm, con margini ripiegati a spigolo

6 Antere 0.7-1.7 mm; segmenti della rachilla 1.5-2 mm; lemma 8-11.5 mm con margini a spigolo vivo

- 7** Pannocchia fino a 25 cm, lassa, precocemente inclinata; spighette glabre o subglabre; rachilla con segmento prossimale di 1.5 mm; resta eretta; antere \pm 1.5 mm; guaine inferiori con pelosità soffice *B. commutatus* subsp. *commutatus*
- 7** Pannocchia non oltre 15 cm, eretta, un po' contratta all'inizio; spighette nettamente pubescenti; rachilla con segmento prossimale di 1.5-1.75; resta un po' divaricata a maturità; antere 2-3 mm; guaine inferiori con fitto tomento biancastro *B. neglectus*
- 6** Antere 1.5-3 mm; segmenti della rachilla 1-1.5 mm; lemma 6.5-8 mm con margini a spigolo smussato *B. racemosus*
- 1** Margini del lemma non arrotolati; basi dei fiori e segmenti della rachilla non visibili a maturità; antecio appiattito, da leggermente concavo a piano
- 8** Lemma 4.5-6.5 mm, con margini ripiegati a spigolo; cariosside superante la palea
- 9** Pannocchia 2-10 cm *B. lepidus*
- 9** Pannocchia fino a 20 cm *B. brachystachys*
- 8** Lemma 6.5-20 mm, con margini variamente ripiegati; cariosside al massimo egualante la palea
- 10** Resta debole, inserita a < 1.5 mm dall'apice del lemma, mai ritorta alla base
- 11** Rami della pannocchia < spighette; lemma cartaceo con nervi prominenti, spesso infossato tra gli stessi; antere 0.6-1.5 mm
- 12** Reste gracili, cilindriche all'inserzione, a maturità sempre erette o appena divergenti; pannocchia aperta, \pm contratta solo alla fine; spighette pelose o glabre
- 13** Lemma a margini stretti e spigoli marginali ottusi o arrotondati; cariosside matura superante la palea
- 14** Lemma 8-11 mm; resta 4-11 mm *B. hordeaceus*
- 14** Lemma 5-7.5 mm; resta (3)4-7 mm
- 15** Pianta alta 15-70 cm; pannocchia 3-10 cm; spighette numerose *B. parvispiculatus*
- 15** Pianta alta 1-8(12) cm; pannocchia 1-3 cm; spighette 1-poche *B. thominei*
- 13** Lemma a margini larghi e spigoli marginali acuti, marcati; cariosside matura egualante la palea *B. pseudothominei*
- 12** Reste piuttosto robuste, appiattite nel punto di inserzione, a maturità divaricate, patenti o deflesse, talora ritorte alla base; pannocchia ricca, compatta; spighette pubescenti *B. molliformis*
- 11** Rami della pannocchia almeno in parte > spighette; lemma coriaceo con nervi non prominenti e \pm indistinti; antere 0.7-5 mm
- 16** Guaine inferiori con peli soffici, appressati; antere 2.5-5 mm; pannocchia 11-30 cm *B. arvensis*
- Lemma 7-8(9) mm, a maturità in asse con la spighetta subsp. *arvensis*
 - Lemma fino a 6 mm, a maturità divergente dall'asse della spighetta subsp. *segetalis*
- 16** Guaine inferiori provviste di setole; antere 0.7-3 mm; pannocchia 4-16 cm
- 17** Antere 0.7-1.7 mm; segmenti della rachilla 1.5-2 mm; lemma 8-11.5 mm con margini a spigolo vivo
- 18** Pannocchia fino a 25 cm, lassa, precocemente inclinata; spighette glabre o subglabre; rachilla con segmento prossimale di 1.5 mm; resta eretta; antere \pm 1.5 mm; guaine inferiori con pelosità soffice *B. commutatus* subsp. *commutatus*
- 18** Pannocchia non oltre 15 cm, eretta, un po' contratta all'inizio; spighette nettamente pubescenti; rachilla con segmento prossimale di 1.5-1.75; resta un po' divaricata a maturità; antere 2-3 mm; guaine inferiori con fitto tomento biancastro *B. neglectus*
- 17** Antere 1.5-3 mm; segmenti della rachilla 1-1.5 mm; lemma 6.5-8 mm con margini a spigolo smussato *B. racemosus*
- 10** Resta robusta, inserita a non meno di 1.5 mm sotto l'apice del lemma, spesso ritorta alla base
- 19** Rami della pannocchia < spighette; pannocchia eretta
- 20** Lemma 11-20 mm; spighette 20-50 mm
- 21** Spighette in prevalenza singole ai nodi; pianta alta fino a 40 cm *B. caroli-henrici*
- 21** Spighette in prevalenza 2+ ai nodi; piante alte fino a 70(80) cm
- 22** Pannocchia fortemente contratta fino alla fine; lemma 10-15 mm, strettamente lanceolato *B. alopecuros*
- 22** Pannocchia contratta da giovane, più lassa a maturità; lemma 11-20 mm, oblanceolato *B. lanceolatus*

- 20** Lemma 6.5-11 mm; spighette 11-25 mm
23 Rami della pannocchia e peduncoli capillari, decisamente flessuosi, con le spighette spesso aggrovigilate *B. intermedius*
23 Rami della pannocchia e peduncoli non capillari, diritti o appena flessuosi; spighette mai aggrovigilate
24 Lemma largo 1.5-2 mm; pannocchia obovoide con rami subverticillati *B. scoparius*
24 Lemma largo 3-5 mm; pannocchia ± ovoide
25 Reste gracili, cilindriche all'inserzione, a maturità sempre erette o appena divergenti; pannocchia aperta, ± contratta solo alla fine; spighette pelose o glabre
26 Lemma a margini stretti e spigoli marginali ottusi o arrotondati; cariosside matura superante la palea
27 Lemma 8-11 mm; resta 4-11 mm *B. hordeaceus*
27 Lemma 5-7.5 mm; resta (3)4-7 mm
28 Pianta alta 15-70 cm; pannocchia 3-10 cm; spighette numerose *B. parvispiculatus*
28 Pianta alta 1-8(12) cm; pannocchia 1-3 cm; spighette 1-poche *B. thominei*
26 Lemma a margini larghi e spigoli marginali acuti, marcati; cariosside matura egualgiante la palea *B. pseudothominei*
25 Reste piuttosto robuste, appiattite nel punto di inserzione, a maturità divaricate, patenti o deflesse, talora ritorte alla base; pannocchia ricca, compatta; spighette pubescenti *B. molliformis*
19 Rami della pannocchia almeno in parte > spighette; pannocchia nutante
29 Antere 2.5-5 mm; spighette spesso arrossate; culmo 80-110 cm *B. arvensis*
 - Lemma 7-8(9) mm, a maturità in asse con la spighetta subsp. *arvensis*
 - Lemma fino a 6 mm, a maturità divergente dall'asse della spighetta subsp. *segetalis***29** Antere 1-1.5 mm; spighette mai arrossate; culmo 20-70 cm
30 Lemma con margine ialino di 0.3-0.6 mm, debolmente ripiegato a spigolo nella metà distale; rami della pannocchia un po' penduli, talora flessuosi, in prevalenza polistachi
31 Lemma largamente lanceolato, > palea; resta a maturità divaricata o deflessa
32 Pianta alta fino a 80 cm; pannocchia fino a 18 cm, con rami patenti o penduli; spighette ovato-lanceolate; lemma 8-9 mm con spigoli arrotondati, non sporgenti; resta 6-10 mm, < lemma, divaricata a maturità *B. japonicus*
32 Pianta non superante 60 cm; pannocchia ≤ 12 cm, con rami sempre penduli; spighette oblunghi-lanceolate; lemma 10-12 mm con spigoli marcati; resta 10-18 mm, ≥ lemma, deflessa a maturità *B. anatolicus*
31 Lemma strettamente lanceolato, ± = palea; resta eretta a maturità *B. subsquarrosum*
30 Lemma con margine ialino di 0.6-0.9 mm, fortemente ripiegato a spigolo nella metà distale; rami della pannocchia mai penduli né flessuosi, in prevalenza monostachi *B. squarrosum*